



Cancer du poumon : facteurs de risques et dépistages

Rubrique : actualités - Date : lundi 15 février 2010

Les spécialistes sont unanimes, il est nécessaire qu'on mette en place un dépistage précoces du cancer du poumon. Le tabac est responsable de 80 % des cancers du poumons, la moitié des 20 % restant est imputable au tabagisme passif, le reste sont des causes diverses comme l'exposition au radon.

Les experts mettent en avant les facteurs de risques que représente la précocité de la consommation de tabac, tout comme une longue consommation. Des études récentes ont prouvé que le facteur essentiel est la durée du tabagisme. « Fumer beaucoup pendant un court laps de temps apparaît moins risqué que fumer moins pendant de nombreuses années, même si les deux sont à bannir, ajoute le Dr Milleron. Il faut aussi savoir que l'arrêt du tabac est intéressant à tout âge. » Le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour pendant vingt ans multiplie le risque de cancer du poumon par 20. Lorsque l'on arrête à 30 ans, le risque est multiplié par 2, à 40 ans il est multiplié par 4. Mais même un faible tabagisme entraîne un risque supérieur à celui du non-fumeur. expliquent-ils dans le Figaro de ce jour.

Des études sont en cours pour déterminer si un suivi régulier médical et notamment par scanner peut permettre de plus grandes chances de guérisons.

[Lire l'article du figaro](#)