



## USA : Chute spectaculaire de la prévalence tabagique en 40 ans

Rubrique : actualités - Date : mercredi 16 mars 2011

---

Ce bilan sur le tabagisme aux U.S., publié par le JAMA dans son édition du 16 mars, montre le résultat des campagnes contre le tabagisme et l'association du grand public aux campagnes de sensibilisation. En effet, en un peu plus de 4 décennies, la prévalence du tabagisme élevé à raison d'un paquet par jour a diminué de 30 à 90% selon les états, la Californie s'avérant un état pilote et pour la mise en place de stratégies de lutte contre le tabagisme et par voie de conséquence pour la baisse de prévalence du tabagisme et du cancer du poumon. souligne santélog.

Ainsi, la population des personnes qui fumaient 20 cigarettes ou plus par jour a diminué de manière significative, tout comme le nombre de fumeurs de 10 ou plus cigarettes par jour, avec des baisses supérieures en Californie en comparaison des autres états.

Aux États-Unis, au début du tabagisme, la consommation s'élevait en moyenne à 1 paquet (soit 20 cigarettes) par jour. Depuis le tout premier bilan des services de santé américains, sur le tabagisme (1964), la baisse de la prévalence du tabagisme s'est avérée importante. Durant toute cette période, la Californie a toujours été l'état pilote des États-Unis pour la mise en place de politiques publiques de réduction du tabagisme, et la baisse de la prévalence du tabagisme en Californie tout comme celle des taux de cancer du poumon a pris de l'avance sur les autres États. Les chercheurs constatent qu'en 1965, la prévalence d'un tabagisme élevé (20 cigarettes ou plus par jour) chez les adultes en Californie (23,2%) ne diffère pas des autres états (22,9%) et que ces fumeurs convaincus représentent 56% de l'ensemble des fumeurs. 2007, cette prévalence ne s'élève plus qu'à 2,6% et 23% des fumeurs en Californie vs 7,2% et 40% des fumeurs dans les autres états. La prévalence du tabagisme d'intensité modérée (10 cigarettes ou plus par jour) en 1965 était de 11,1% en Californie vs 10,5% dans les autres états ; en 2007, la prévalence en Californie n'est plus que de 3,4% vs 5,4% dans le reste-Unis des États-Unis.

Il semblerait que les premiers effets de cette baisse de prévalence se fassent ressentir dans le nombre de cancer liés au tabac. Pour en savoir plus ce dernier point, [consultez le site de santélog](#)