



Le champix : des risques cardiaques ?

Rubrique : actualités - Date : mardi 5 juillet 2011

"Après les troubles dépressifs et les pulsions suicidaires, voilà que certaines études suggèrent une augmentation du risque d'événements cardiaques. L'état paraît se resserrer autour du tartrate de varénicline, indiqué dans l'aide au sevrage tabagique et commercialisé en France sous le nom de Champix®. Deux études américaines en effet, mettent en évidence une légère - augmentation du risque d'effets secondaires cardiaques.

Le 16 juin dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a publié son analyse d'un essai clinique portant sur 700 fumeurs de 35 à 75 ans, atteints d'une maladie cardiovasculaire. La moitié avait pris du Champix®, les autres un placebo. Troubles vasculaires, angine de poitrine voire infarctus du myocarde (sans dénouement non mortel toutefois) & Au bout de 12 semaines de suivi, les auteurs ont observé davantage de problèmes cardiovasculaires dans le premier groupe (5 cas) que dans le second (3 cas). Les chiffres sont apparemment modestes, mais significatifs.

Dans un autre travail publié ce lundi 4 juillet dans la Canadian Medical Association Journal, une équipe anglo-américaine a compilé 14 études contre placebo réalisées sur le sujet. Au total, 8 216 participants ont été pris en compte, 4 908 traités par Champix et 3 308 qui avaient reçu un placebo. « Dans tous les essais à l'exception d'un seul, les patients présentaient des antécédents de maladies cardiovasculaires », précisent les auteurs....[...]"

source :destinationsanté

[Lire la suite de l'article destination santé](#)