



tabagisme passif : une incidence sur l'audition des adolescents

Rubrique : actualités - Date : vendredi 22 juillet 2011

"Le Pr Ani Lalwani et ses collègues du Langone Medical Center de New-York ont examiné les dossiers médicaux de 1 533 jeunes âgés de 12 à 19 ans, qui ont été par la suite interrogés sur leur état de santé, sur leurs capacités auditives, sur leurs antécédents familiaux, et enfin l'exposition secondaire à la fumée qu'ils auraient pu subir plus jeunes. Les chercheurs ont ensuite analysé des échantillons sanguins de chacun d'entre eux pour mesurer le taux de nicotine dans leur sang. Enfin, les adolescents participants à l'étude ont été soumis à divers tests auditifs. Les résultats sont sans appel. Plus le taux de nicotine dans le sang est élevé, plus les chercheurs ont constaté des pertes auditives. De plus, 80% des participants n'avaient pas conscience qu'ils souffraient de leur déficience auditive. La principale cause de cet état de fait seraient les otites à répétition que l'on constate chez les jeunes enfants exposés au tabac. À terme, elles entraînent des dommages irréversibles sur les tympanes. Une autre explication pourrait être que la nicotine ait un effet direct sur l'oreille interne sans qu'il y ait inhalation de la fumée."

source : informationhospitaliere.com [lire l'article dans son intégralité sur le site d'informationhospitaliere.com](http://informationhospitaliere.com)