



La mortalité due au tabac est largement sous-estimée

Rubrique : actualités - Date : mardi 3 mars 2015

Selon une étude, menée sur près d'un million de personnes et publiée dans le New England Journal of Medicine, les chiffres sur la surmortalité des fumeurs seraient sous-estimés de 17 %. Cette étude a permis d'identifier une quinzaine de nouvelles causes de décès prématurés liées au tabagisme, en plus des 21 pathologies déjà connues. Parmi ces nouvelles pathologies : l'insuffisance rénale et l'ischémie intestinale.

« L'ampleur [de la cohorte] nous a permis d'analyser des causes de décès trop rares pour ressortir dans de plus petits échantillons », expliquent les auteurs de l'étude, conduits par le Dr Brian Carter, de la Société américaine sur le cancer.

Si le cancer du poumon est la pathologie dont le lien avec le tabac est le plus évident (90 % des malades sont fumeurs ou l'ont été), il en existe de nombreuses autres maladies dont le lien avec le tabagisme est prouvé : les cancers ORL, de l'œsophage, de la vessie, du pancréas, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, le diabète. Les pathologies nouvellement associées au tabagisme ont en commun des mécanismes inflammatoires, vasculaires et/ou thrombotiques, pour lesquels le tabac a un effet aggravant .

Avec ces nouvelles données, le nombre de victimes du tabac aux États-Unis, estimé à 437.000 par an, devrait être rehaussé d'au moins 60.000. En France, le nombre de décès annuels provoqués par le tabac est estimé à 78.000.

Source : lefigaro.fr