



L'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans 63 pays du monde

Rubrique : actualités - Date : mardi 6 décembre 2016

L'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans 63 pays du monde Une étude publiée par Tobacco Control évalue l'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans le monde entre 1980 et 2010. Des données relatives à la mortalité spécifique à cette cause ont été extraites de la WHO Mortality Database (base de données de l'OMS sur la mortalité, disponible en anglais) (1980-2010) pour 63 pays. Les chercheurs ont également estimé le gain potentiel d'espérance de vie à l'âge de 40 ans si les maladies liées au tabac à un âge moyen (40-79 ans) étaient éliminées. Parmi les 63 pays inclus dans l'étude, 2 se situaient en Afrique, 15 en Amérique, 12 en Asie, 32 en Europe et 2 en Océanie.

Les principaux résultats

· Le tabagisme est associé à environ 20 % de la mortalité totale chez l'adulte (24 % chez l'homme et 12 % chez la femme) dans les 63 pays inclus dans cette étude. · Si les maladies liées au tabac étaient éliminées, l'espérance de vie chez l'adulte augmenterait en moyenne de 2,4 ans chez l'homme et d'1 an chez la femme. · Alors que le taux de mortalité lié au tabac chez l'homme a reculé dans la quasi totalité des pays, il a en revanche augmenté dans le pays le plus peuplé du globe, la Chine, passant de 4,6 % à 7,3 %. · Une augmentation de l'impact du tabac sur l'espérance de vie chez la femme a été observée dans les pays à haut revenu.

Les messages forts · Dans presque tous les pays inclus dans l'étude, l'épidémie de tabagisme n'a pas encore atteint son apogée. Le tabagisme devrait continuer à avoir un impact négatif tant qu'elle ne commence pas à reculer. · Des interventions efficaces sont nécessaires afin de prévenir l'impact catastrophique attendu du tabagisme sur la santé mondiale. · La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les Directives pour son application définissent des mesures fondées sur des données factuelles visant à réduire le tabagisme et l'exposition à la fumée de tabac, et notamment des politiques prévoyant :

o la protection totale contre l'exposition à la fumée secondaire en instaurant des lieux publics non fumeurs ; o l'interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac ; o des mises en garde sanitaires illustrées de grand taille sur les produits du tabac ; et o des mesures financières et fiscales visant à réduire l'accessibilité des produits du tabac. Citation complète : Rentería, E., P. Jha, D. Forman, and I. Soerjomataram. The Impact of Cigarette Smoking on Life Expectancy between 1980 and 2010 : A Global Perspective. Tobacco Control 25.5 (2015) : 551-57. Web. L'étude complète est disponible (en anglais uniquement) à l'adresse suivante : <http://tobaccocontrol.bmj.com/cont...>