



# L'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans 63 pays du monde

Rubrique : actualités - Date : mardi 6 décembre 2016

**L'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans 63 pays du monde** Une étude publiée par Tobacco Control évalue l'impact du tabagisme sur l'espérance de vie dans le monde entre 1980 et 2010. Des données relatives à la mortalité spécifique à cette cause ont été extraites de la WHO Mortality Database (base de données de l'OMS sur la mortalité, disponible en anglais) (1980-2010) pour 63 pays. Les chercheurs ont également estimé le gain potentiel d'espérance de vie à l'âge de 40 ans si les maladies liées au tabac à un âge moyen (40-79 ans) étaient éliminées. Parmi les 63 pays inclus dans l'étude, 2 se situaient en Afrique, 15 en Amérique, 12 en Asie, 32 en Europe et 2 en Océanie.

## Les principaux résultats

· Le tabagisme est associé à environ 20 % de la mortalité totale chez l'adulte (24 % chez l'homme et 12 % chez la femme) dans les 63 pays inclus dans cette étude. · Si les maladies liées au tabac étaient éliminées, l'espérance de vie chez l'adulte augmenterait en moyenne de 2,4 ans chez l'homme et d'1 an chez la femme. · Alors que le taux de mortalité lié au tabac chez l'homme a reculé dans la quasi totalité des pays, il a en revanche augmenté dans le pays le plus peuplé du globe, la Chine, passant de 4,6 % à 7,3 %. · Une augmentation de l'impact du tabac sur l'espérance de vie chez la femme a été observée dans les pays à haut revenu.

**Les messages forts** · Dans presque tous les pays inclus dans l'étude, l'épidémie de tabagisme n'a pas encore atteint son apogée. Le tabagisme devrait continuer à avoir un impact négatif tant qu'elle ne commence pas à reculer. · Des interventions efficaces sont nécessaires afin de prévenir l'impact catastrophique attendu du tabagisme sur la santé mondiale. · La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les Directives pour son application définissent des mesures fondées sur des données factuelles visant à réduire le tabagisme et l'exposition à la fumée de tabac, et notamment des politiques prévoyant :

o la protection totale contre l'exposition à la fumée secondaire en instaurant des lieux publics non fumeurs ; o l'interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac ; o des mises en garde sanitaires illustrées de grand taille sur les produits du tabac ; et o des mesures financières et fiscales visant à réduire l'accessibilité des produits du tabac. Citation complète : Rentería, E., P. Jha, D. Forman, and I. Soerjomataram. The Impact of Cigarette Smoking on Life Expectancy between 1980 and 2010 : A Global Perspective. Tobacco Control 25.5 (2015) : 551-57. Web. L'étude complète est disponible (en anglais uniquement) à l'adresse suivante : <http://tobaccocontrol.bmj.com/cont...>