



L'exposition au tabac associée à l'infertilité et à la ménopause précoce

Rubrique : actualités - Date : vendredi 30 décembre 2016

L'exposition au tabac associée à l'infertilité et à la ménopause précoce

Une étude publiée par Tobacco Control se penche sur les associations entre l'exposition prolongée au tabac (y compris le tabagisme actif et le tabagisme passif), d'une part, et l'infertilité et la ménopause précoce avant l'âge de 50 ans, d'autre part. Cette recherche se fonde sur des données issues de la Women's Health Initiative Observational Study, une étude des femmes ménopausées âgées de 50 à 79 ans qui vivent aux États-Unis. Parmi les 93 676 femmes participant à la Women's Health Initiative Observational Study, 88 732 d'entre elles ont fourni des données exhaustives pour l'analyse sur la fertilité et 79 690 ont communiqué des informations complètes pour l'analyse de la ménopause naturelle.

Les principaux résultats

Le tabagisme actif et l'exposition au tabagisme passif sont associés avec l'infertilité et la ménopause naturelle précoce (avant l'âge de 50 ans).
o 15,4 % des femmes ont signalé être infertiles.
o 45 % des femmes ont signalé être ménopausée de manière précoce. Les fumeuses actives (actuelles ou anciennes) ont été ménopausées 21,7 mois avant l'âge moyen de 49,4 ans pour les personnes n'ayant jamais fumé et n'ayant jamais été exposées au tabagisme passif.
· Les femmes exposées au risque le plus élevé de tabagisme passif ont connu une ménopause précoce de 13 mois.

Les message forts

L'exposition au tabac est associée à l'infertilité et à la ménopause précoce (avant l'âge de 50 ans).

De solides actions doivent être mises en place afin de protéger les femmes des effets nocifs du tabagisme et de l'exposition au tabagisme passif. La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les Directives pour son application identifient les mesures visant à réduire le tabagisme et l'exposition à la fumée de tabac, notamment des politiques prévoyant :

o l'interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics afin de protéger le public du tabagisme passif ;

o l'interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac ;

o des mises en garde sanitaires illustrées de grand taille sur les produits du tabac ;

o des mesures financières et fiscales visant à réduire l'accessibilité des produits du tabac.

Citation complète : Hyland, Andrew, Kenneth Piazza et.al., « Associations between Lifetime Tobacco Exposure with Infertility and Age at Natural Menopause : The Women's Health Initiative Observational Study », Tobacco Control 2016, 25 : 706-714. Le résumé de cette étude est disponible (EN ANGLAIS UNIQUEMENT) à l'adresse suivante : <http://tobaccocontrol.bmj.com/conte...> Autres ressources : · Pour obtenir un point sur les faits relatifs aux effets nocifs du tabac affectant les femmes (en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en portugais et en russe), consultez la page suivante : <http://global.tobaccofreekids.org/f...> Pour toute question concernant cette publication ou la façon dont vous pouvez l'utiliser dans le cadre de vos efforts de lutte antitabac, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante : globalresearch@tobaccofreekids.org