



Confirmation : le tabagisme passif augmente le risque de mort subite du nourrisson

Rubrique : actualités - Date : mardi 10 septembre 2002

Fumée passive : risque de troubles cardiaques chez le nouveau-né

(AT) La mort subite du nourrisson est la cause mortelle la plus fréquente chez le nouveau-né. Les causes en sont multiples, mais de nombreux indices font apparaître, au fil du temps, un risque de mort subite du nourrisson plus élevé lorsque la mère a subi l'influence de la fumée passive au cours de la grossesse. Une équipe de chercheurs des universités de Florence, Rome et Bari donne quelques explications.

Cette équipe italienne a livré des rats au poison respiratoire constitué par le monoxyde de carbone, dans une concentration égale à la quantité de cette substance dans le sang d'une fumeuse de cigarettes. Les chercheurs ont abouti à la conclusion suivante : le contact régulier avec du monoxyde de carbone avant la naissance provoque des troubles du réseau de conduction du muscle cardiaque chez le nouveau-né. Ces troubles peuvent augmenter le risque de mort subite du nourrisson. Des troubles de la conduction cardiaque peuvent, on le sait, présenter un risque mortel.

Source : Elisabetta Cerbai, Alessandro Mugelli, Evidence of a relationship between smoking during pregnancy and Sudden Infant Death Syndrome, Communiqué de presse à l'issue du [XXIVe congrès de la Société européenne de cardiologie](#), Berlin, Allemagne 31 août - 4 septembre 2002.