



## Le taux de cancer du poumon suit la courbe du tabagisme

Rubrique : actualités - Date : mercredi 5 février 2003

---

Le Monde pour qui « le taux de cancer du poumon suit la courbe du tabagisme » rend compte des données présentées lors du congrès international sur les traitements du cancer par Sir Richard Peto « l'un des plus célèbres épidémiologistes de la planète » pour avoir, dès 1950, démontré la responsabilité du tabac dans le développement de cancers du poumon. Indiquant que R. Peto a « illustré la décroissance continue (&) Outre Manche de la mortalité masculine due à cette maladie », le quotidien souligne qu' en France, d'après les données présentées par Catherine Hill de l'institut G. Roussy, « malheureusement l'évolution suit le modèle inverse », puisque chez les hommes de 35 à 54 ans les décès par cancer du poumon ont « plus que doublé en quarante ans ». Le journal qui relève que « la spectaculaire diminution de la mortalité masculine par cancer du poumon Outre Manche suit en parallèle cette du tabagisme » souligne que « depuis le début des années 1950, le public britannique a été largement informé des méfaits du tabac » alors qu'en France l'information a été « nettement plus tardive » avec en 1887 le premier rapport établissant un lien entre tabagisme , cancer du poumon et autre maladies mortelles (Albert Hirsch).. Donc, d'après le quotidien « rien de surprenant que les courbes de la mortalité soient décalées dans le temps ». Affirmant que « les projections de décès au niveau mondial, si la consommation de tabac ne diminue pas , sont effrayantes » avec 500 millions de morts pour les années 2050-2100, Paul Benkimoun fait état de la démarche proposée par le Pr Albert Hirsch qui associe « l'approche individuelle et sociétale » c'est à dire : à chaque consultation l'évocation de ce sujet et la proposition d'une aide au sevrage par le médecin mais aussi « l'application effective » de la loi Evin.