



BPCO et Tabac

Rubrique : actualités - Date : lundi 3 septembre 2007

LE FIGARO du week-end, qui rappelle que la bronchite chronique obstructive (BPCO) ne touche pas seulement les fumeurs mais aussi les non-fumeurs exposés au tabagisme passif et à d'autres fumées domestiques, précise que cette maladie est responsable de 2,5 millions de morts par an dans le monde. Selon un dossier consacré à la BPCO dans l'hebdomadaire britannique The Lancet, elle pourrait devenir la troisième cause de mortalité et la cinquième cause de handicap dans le monde en 2020. Un expert déplore : « malheureusement, elle est sous-diagnostiquée, sous-traitée, négligée par le public, par l'industrie pharmaceutique et même par les médecins ». Le journal signale qu'une enquête menée dans 12 pays a pu montrer que 11,8% des hommes et 8,5% des femmes souffrent de BPCO. Les chercheurs expliquent que « si le tabagisme plus volontiers masculin explique une telle différence notamment dans les pays fortement ou moyennement développés, dans les pays en voie de développement, c'est plutôt la pollution de l'air due à des émanations de combustibles utilisés pour le chauffage ou la cuisson des aliments qui est incriminée ». Une autre étude réalisée en Chine, où 60% des adultes n'ont jamais fumé, montre que la BCPO causée par le tabagisme passif pourrait provoquer de 0,9 à 2,8 millions de décès. Le quotidien indique qu'en France, 5 à 10% de la population adulte sont atteints de bronchite chronique et que cette maladie est responsable de 15 000 morts chaque année.